

Référence bibliographique

ABDELKRIM H ., 1995. Contribution à la connaissance des mauvaises-herbes des cultures du secteur algérois, approche syntaxonomique et morphologique, Thèse Doctorat, Univ Paris-Sud Centre d'Orsay, 151P.

ABDELLAOUI Z., FETTH S., ZEGHOUANE O., 2006. Etude comparative de l'effet du semis direct et du labour conventionnelle, Semis direct et travail minimum sur le comportement d'une culture de blé dur dans la zone subhumide. Ed.4ème Rencontres Méditerranéennes du semis Direct .Zaragoza .pp115_120

AIBAR J., 2006. La lutte contre les mauvaises herbes pour les céréales en semis direct ; principaux problèmes, In Arrue ugarte J.L. Ed. Cantero-Martinez C.,Troisième Rencontre Méditerranéenne du semis direct, Zaragoza, CIHEAM, Option Méditerranéennes n°69 : 69-70.

Al-Ahmad M J., 1982. Competition interrelation and impact of weeds on Soil moisture and yield of lentils in dry region ACSAD, Soil science division, 379p

ARES, G.2006: Le semis direct économique et écologique, La coopérateur agricole juillet –aout, 2006, La coop fédérée www.lacoop.coop.pp20_30

ARMARIC N., BREZILLON ., CRE. FAIQ M., SCHROEDER A., 2008. <La vulgarisation de l'agro écologie : De la théorie auterrain> octobre2008, Projet et INP_ENSAT/sologro, PP1_4 .

ANONYME, 2001. L'agriculture par les chiffres, Statistiques agricoles Ed. Ministère de l'agriculture.

ANONYME,2002. Semis direct, Rev. Les secrets de la réussite, pp: 59-62.
<http://www.gov.on.ca/OMAFRA>. (9), pp 23-31.

Anonyme, 2006. Gestion responsable des herbicides des céréales. Agriculture et Agroalimentaire, Canada, Rapport final de recherche E2006-06, 6 p.

ANONYME, 2008. Résultat d'un essai conduit à l'unité INRA d'agronomie paris grignon : utilisation de culture associées en semis direct technique cultural simplifiées, n°46 janvier_février 2008, PP, 21_23

ANONYME, 2014. L'agriculture de conservation pour l'intensification écologique. Principe et contraintes à l'adoption dans les pays du sud (PDF) .Ed.Glossaire, CIRAD : 10p.

AUBERT, G., 1978. Méthode d'analyse courante en pédologie, Choix expression, présentation, Interprétation, INRA, Paris, 172P

BAIZE D., 1981. Guide des analyses ses courantes en pédologie, choix expression, présentation, Interprétation, INRA, Paris, 172P

BAIZE D., 1988. Guide des analyses ses courantes en pédologie, Choix expression, présentation, Interprétation, INRA, Paris, 172P.

BARRALIS G., 1977. Seuils de nuisibilité des mauvaises herbes. Phytoma(288) ; pp.7-15, 1977

BARRALIS G., 1984. Adventices des cultures 50 à 500 millions de semences/ha. Cultivar, spécial désherbage, 178: 16-19.

BARRALIS G., GHADOEUF R., et DESSAINT F.,1992. Influence a long terme des technique culturales sur la dynamique des levée au champ d'adventices, IXème colloque, internationale, biologie, écologie et systématique des mauvaises herbes, Dijon, P12.

BALAI D., 1996. Aspect de la céréaliculture Algérienne. Ed. INES de Batna, 82p.

Cowbrough ; 2002. Principe de lutte intégrée contre les mauvaises herbes.
<http://www.gov.on.ca/OMAFRA/french/crops/facts/iwm.htm>

BELAI DJ., 1996. Aspect de la céréaliculture Algérienne. Ed. INES de Batna, 82p.

BEN SADDEK ET BARRAH, 2014. Contribution à l'étude de l'effet de désherbage sur la dynamique des adventices en agriculture de conservation dans la région de M'sila

BENNIUO R., CHRISTINE AUBRY., KHALED ABBES., 2014. Analyse des itinéraires technique dans les exploitations agricoles céréalières en milieux semi-aride de l'est algérien

BLANCANEUX ph., PI, DE, FREITAS, RT, AMOBILE, DECARVALHO A., 1993. Le semis direct comme pratique de conservation des soles des cerrados du Brésil central, *cih, orstom, ser. Pédol.*, vol. XXVIII, n02, 1993 : PP 253_275.

BOUFENAR _ZAGHOUE F., et ZAGHOUE O., 2006. Guide des principales variétés de céréales à paille en Algérie (blé dur, blé tendre, orge et avoine). ITGC d'Alger, 1ère Ed, 152p.

BOULAFKHAR M N., 1989. Etude physiologique de certains groupements de mauvaises herbes dans la plaine de MITIDJA. Thèse magistère, ins.nat.agro. El-Harrach, 104p.

BOULAL H., ZEGHOUE O., EL MOURID M., et REZGUI S., 2007. Guide pratique de la conduite des céréales d'automne (blés et orge) dans le Maghreb (Algérie, Maroc, Tunisie). Ed. TIGC, INRA, ICARDA, Algérie, 176 p.

BOURARACH H E., 1998. Engrais vert et fertilité des sols, 2ème Ed.AGRIDECISIONS, Paris, 304 P.

BOURARACH E H., et OUSSIBLE M., ,1995 . Management du sol en milieux aride et semi-aride, In EL_GHAROUS M., et al, (eds), proceeding of international dry land agriculture conférence, May 1994, RABAT, morocco, PP 74_82.

BOURARACH H E., 1989. Mécanisation de travail du sol en céréaliculture pluvial : Performance technique et aspect économique dans une région semi-aride a Maroc, Thèse science agronomique, IAN, HASSAN II, RABAT.

BOUEZRZOUR H., 1998. Sélection pour le rendement, La précocité a l'épiaison et la biomasse aérienne chez l'orge semi-aride, Thèse d'état : Université de Constantine ; 170p

CALLOT G., CHAMAGOU H., MAERTENS C., et SALSAC L., 1982 .Mieux comprendre les interactions entre sol-racines, incidences sur la nutrition minérale. INRA, Paris., 325 P.

CAUSSANEL J.P., 1988. Nuisibilité et seuils de nuisibilité des mauvaises herbes dans une culture annuelle : situation de concurrence bispécifique. *Agronomie (1989) Elsevier /INRA*, 219-240.

CAUSSANEL J.P., 1989. Nuisibilité et seuil de nuisibilité des mauvaises herbes dans une culture annuelle. Situation de concurrence spécifique. *Rev. Agronomie*, n° 03: 219-240.

CAUSSANEL J.P., 1996. Concurrence, compétition et nuisibilité des mauvaises herbes *Rev. Phytoma*, n°484: 21-24.

CAUSSANEL J.P. et BARRALIS G ., 1973. Phénomène de concurrence entre les végétaux .In- 5ème colloque international sur l'écologie et biologie des mauvaises herbes .Ed. Columa .Marseille .France, 40 p

CLUZEAU_MOULAY S, et Grillet J-P., 2007. Utilisation des produits phytosanitaires. In produits phytosanitaires : intoxication aiguës et risque professionnels, Ed. ESKA, Paris, Pp.27-36.

CHADOEUF H., 1985. La dormance chez les semences de mauvaises herbes. *Rev. Agro.*, Vol 5, N° 8. Pp 761-772

CLEMENT J.M., 1981. Dictionnaire Larousse Agricole. Librairie Larousse. ISBN 2-03-514301-2. 1207p

CHEVRIER A., et BARBIER S., 2001. Performances économique et environnemental des techniques agricoles de conservation du sol, Création d'un référentiel et premier résultat.

CAROF ,2006 . Fonctionnement de peuplement es semis direct associant de blé tendre d'hiver a différent plante de couverture en climat tempéré, Thèse de doctorat INA, PG, 132p.

Combe L, et Picard D ., 1994 Elaboration du rendement des principales cultures annuelles INRA, Ed .191p

COUVREUR F., Gate P., I INGOAT G., et Masse J., 1984. Les stades du blé ITCF. REF 8417805-3 Cer-AGR 1: 3-14.

DAJOZ, R, 2003. Précis d'écologie, 7ème édition, Ed, dunod, paris, 615p.

DORE T., LE BAIL M., MARTIN P., NEY B., ROGER-ESTRADE J. coordonnateur, *L'agronomie aujourd'hui*, QUAE éditions, 2006, 173 p.

DETROUX L., 1975. Les herbicides et leur emploi .Guide pratique Duculot. 3^{ème} Edition, Paris .France, 145 p.

DOTCHEV D., et Belaid D., 1990. Stratégie de désherbage. Rev .Perspectives agricoles, n°196: 61-63.

EL-AISSAOUI, A., A-EL BRAHLI, O.EL-GHARRAS, N. EL HANTAOUI, 2009. Le semis direct pour une agriculture pluviale de conservation ; pp 249_256. Symposium internationale <agriculture durable er région méditerranéenne (AGDUMED) > RABAT, Maroc, 14-16 MAI 2009.

EL BRAHLI, A., O. EL GHARRAS, N .EL HANTAOUI .2009 Le système semis direct nouveau mode de production et modèle d'agrégation pour une agriculture pluviale durable au Maroc , transfert technologie en agriculture N° 182/novembre 2009.

EL-BRAHLI .A, 2004, le semis direct opportunité pour une agriculture pluviale durable n° 37/08-80.

EL Gherbi N., 2004. Contribution a l'analyse des méthodes de lutte contre les mauvaises herbes des céréales. These ing. INS. Nat. Agro. El-Harrach, 66p.

Eliard J .L. 1979: Manuel d'agriculture general , Ed ,J_B Balliere, 332p

FISHER R.A., MAURER R., 1978 Resistance in spring wheat cultivars-T. Grain Field responses, AUST_J agric, Res, 29, pp697-912.

FENNI M., 1991. Contribution à l'étude des groupements messicoles des Hautes Plaines Sétifiennes. Thèse de Mag. Univ., Ferhat Abbas, Sétif, 142p.

FRIED G., CHAUVEL B. et REBOUD X., 2008. Évolution de la flore adventice des champs cultivés au cours des dernières décennies : vers la sélection de groupes d'espèces répondant Aux systèmes de culture. Innovations Agronomiques, p26.

FELLIACHI ., 2000. Programme de développement de la céréaliculture en Algérie, ITGC, El-Harrach: actes du premier symposium international sur la filière blé 2000; enjeux et stratégies/Alger 7-9 Février 2000: 27P.

Gallais A., Bannerot H., 1992. Amélioration des espèces végétales cultivées. Objectifs et critères de sélection. Ed : INRA, 768p

Grillot, 1959. La classification des orges cultivées. Au. Am. Plantes, 4: 446-486.

Godinho M., 1984. Les définitions "d'adventices" et de "Mauvaises-herbes". Weed Res., 24 (2) : 121-125.

Guignard J.L., Et Dupont F., 2004. Botanique Systématique moléculaire. 13 Ed. Révisé Masson Paris. Pp 116-117.

Halli L., Abaidi I. et Hacene N., 1996. Contribution à l'étude phréonologique des adventices des cultures dans les stations INA (céréales), de l'ITGC (légumineuses) et de l'ITCMI (pomme de terre). Thèse Ing. INA, El-Harrach, 86 p.

Hamadache A., 1988. Effet de la compétition des graminées adventices durant les différentes phases de la vie du blé sur les composantes du rendement en zone Sub-humide céréaliculture (21) ; pp.1-7

HAMADACHE A., 1995. Les mauvaises herbes des grandes cultures. Biologie, écologie, moyens de lutte. ITGC, 40-55p.

HAMADACHE A., MAKHLOUF M. ET HARKATI N., 2002. Effet de la date et de l'outil de travail de sol sur le comportement des bromes (*Bromus* SP) et le rendement de blé dur (*Triticum durum*). Dans la région de Sétif. Dans : Céréaliculture, 37, pp. 24-29.

- HENRIOT F., 2002-** Désherbage in Blé tendre : marchés, débouchés, techniques culturale, récolte et conservation. Ed. ITCF céréaliers de France, pp.50-53.
- Heller R., 1982.** Physiologie végétale. Tome 2. Développement. Ed. Masson, Paris, 215 pp.
- I.T.G.C. 2009b.** L'ogre. la variété El Fouara .Document de vulgarisation :2p.
- JAUZIEN 1 .P, 2001** < biodiversité des champs cultivés : l'enrichissement floristique, poussie de l'environnement de INRA, n°21, 22p>.
- JAUZIEN 2P. 2001** L'appauvrissement floristique des champs cultivés agriculture et biodiversité des plantes, Dossier de l'environnement de l'INRA, série n°21 ,43_64p.
- JESTIN L., 1992.** L'orge. In, Gallais A. et Bannerot H. Ed., Amélioration des espèces végétales cultivées. Ed. INRA, Paris, pp. 55- 70.
- JUSSIAUX P .et PEQUIGNOT R., 1962.** Mauvaises herbes, Techniques de lutte. Ed- Maison rustique, Paris, France, 218 p.
- KADRA N., 1979.** Rôle des mauvaises herbes dans la production céréalière et les effet des différents méthode .Cinquième conférence régionale des céréale d'hiver ; ITGC. Céréaliculture Vol 11 ; pp22_34.
- KHOURI R., 1992.** Méthode de lutte contre les adventices .Rev.El-Ardh, Vol 19 :pp15-18.
- KARKOUR L., 2012.** La dynamique des mauvaises herbes sous l'effet des pratiques culturales dans la zone des plaines intérieures. Diplôme de magister, Université de Ferhat Abaas-Sétif ,104p.
- KECHROUD H. et STITI S., 1996.** Étude phrénologique des mauvaises herbes sur la culture de féverole (*Vicia faba mino*) dans la région d El-Harrach .Thèse d ingénieur, INA El-Harrach, Alger, pp : 17-18.
- KHAIATI M., 2008.** L'agriculture algérienne de 1^{ère} précoloniale au reforme libérale actuelle. Ed. ANEP. Rouïba 2008. 254P.
- LONCHAMP H., 1977.** Nuisibilité des mauvaises herbes Rev. Phytoma n ° 288 : 7-15
- LONCHAMPS et BRRALIS 1988.**
- MARTIN P., 1957.** Die abgabe von organischen verbindungan insbesondere von scopoletin aux denkeimwurzeindes hafers .Z .Bot .45-475-506
- Mamarot J., Rodriguez A. (2003).** Sensibilité des mauvaises herbes aux herbicides en grands culture, ACTAED, Paris, 372P
- MCCULLY K.ET R. TREMBLAY et CHIASSON, 2004** .Guides de lutte intégrée contre les mauvaises herbes dans les cultures de fraises. Ministère de l'agriculture, pêches et de l'Aquaculture du Nouveau-Brunswick(MAPANB) ,15p.
- MELAKHESSOU Z., 2007.** Étude de la nuisibilité directe des adventices sur la culture de pois chiche d'hiver (*Cicer arietinum* L) variété ILC 3279, cas de *Sinapis arvensis* L. Thèse de Magister, Université El-hadj Lakhdar–Batna, 51p.
- MONTEGUT J ., 1980.** Les mauvaises herbes. Rev. Perspectives agricoles, n° 4 Paris : 13-31.
- MONTEGUT J., 1975.** Ecologie de la germination des mauvaises herbes. In *la germination de semences*. Ed. Gauthier-Villard, Paris. pp.191-218.
- MRABET R., 2001b.** Semis direct : potentiel et limite pour une agriculture durable en Afrique eu nord.CEA/TNG/CDSR/AGR, Tanger.29p.
- MAMMERI A et SILEM M., 2010.** Contribution à l'étude de l'effet de la technique du semis direct sur la production céréalière en milieu semi-aride. Cas de la région de Béni-Fouda, Sétif. Mém. d'ingénieur, Université de M'SILA, 43 p.
- MAZLIAK P., 1982.** Physiologie végétale II. Croissance et développement. Hermann éd.
- OLIVEREAU .,1996.** Les plantes messicoles des plaines françaises. Le courrier de l'environnement.N°28, Août1996. 67p.<http://www.inra.fr/internet/Produits/dpenv/olivec28.htm>.
- PREVOST PH., 2006.** Les bases de l'agriculture 3^{ème} Ed., TEC & DOC, Lavoisier, Paris, 290 P.

- PUTMAN A.R., ET WESTON L.A., 1986.** Adverse impact of Allelopathy in agricultural systems. Rev. The science of Allelopathy Wiley Interscience Pub. n° special: 43-57.
- PIEGNE J.H, VEDEJ., DEMEUSY.M., GERBER.JF., VIAN L., GAUTRONNEAU L., CONNAVACCUOL J.M., AVELINE A., L.CITAU A., BERRY D., 2009.** Techniques sans labour en agriculture biologique, Innovations agronomique (2009). pp23-32
- PAUSSET J., 2002** Engrais verts et fertilité de sols, 2ème Ed, AGRIDECISINNS, Paris ,304p
- ROPERT D., DESOUTTERY P., et ROISIN R., 1991.** Connaitre la période de nuisibilité de la folle avoine dans le blé d'hiver pour les régions ouest de la France. Perspective agricole(154) ;
- REYNIER A., 2000.** Manuel de viticulture. 8^{ème} Ed. Tec et Doc. 514 p.
- RODRIGUEZ A., 2004.** Le contrôle de la flore adventice en grandes cultures biologiques. Alter agri n°68. P 4-7
- ROLLIN D., 2000.** Mise au point d'itinéraire technique avec semis direct et couverture permanente du sol dans la zone coton du nord cameroun,mission Tchad-nord , Cameroun 20/01/2000_31/01/2000, mission Tchad cameroun,Doc,pp1-19.
- RAMADE F., 2003.** Elément d'écologie fondamentale. 3ème édition, Ed. Dunod, Paris, 690p. *Rev. Recherche Agronomique*, n°19 (juin 2007).Ed. INRA, Alger, 7-13.
- ROUNET M.L., SEGUY C., FOVET R., 1998 .**Semis direct sur couverture végétale permanent su sol: de la technique a concept, Document obtenu sur site Cirad de réseau.
[http://agroecologie,cirad,fr,23,28rars1998,Anaec,cirad,Fafala,fifannonor,fofifa,tata, Montpellier, france,cirad,collection colloques 658p](http://agroecologie.cirad.fr,23,28rars1998,Anaec,cirad,Fafala,fifannonor,fofifa,tata, Montpellier, france,cirad,collection colloques 658p).
- SAFIR A., 2007.** Approche phrénologiques de quelques groupements d'adventices des cultures Région de Tipaza.73p
- SAXENA M. C ., SINGH K B., et JOSMIN L ., 1996.** Rev. Agro systems Field crop. Ed. CAB intern, pp: 890-891.
- SOLTNER D., 1990.** Pyrotechnie spéciale, Les grandes productions végétales. Céréales, plantes sarclées, prairies. Sciences et Technique Agricoles éd.
- SOUFI Z., 1988.** Les principales mauvaises herbes des vergers dans la région maritime de Syrie. *Weed Res.*, 28 (4):199-206
- SOLTNER D., 2005.** Les grandes productions végétales. 20ème Edition. Collection science et techniques agricoles. 472p.
- SOLTNER D., 2005.** Les grandes productions végétales.20ème Ed. CCTA. pp: 20-140
- SELTZER.P.1946** Le climat de l'Algérie recueil de données météo ; Institut de technologie agricolt, Mostaganem(Algérie).
- SEBILLOTTE M., 1967 .**Compétition entre blé et graminées adventices, Rôle des rotations culturales. Compte rendus de l'académie d'agriculture de France, Vol. 17 ; pp : 1374-1388.
- TISSUT M., DELVAL PH., MAMAROT J. et RAVENEL P., 2006.** Plantes, herbicides et désherbage .2ème Ed ACTA, paris ,635p.
- Tanji K .K, Fried M. et Van de Pol. R .M. 1977.** A steady –state conceptual nitrogen model for estimating nitrogen emissions from cropped lands, *journal environmental quality*, Vol 6 n°2 .pp 155-162.
- VIAN Jean-François, 2009.** Comparaison de différentes techniques de travail du sol en agriculture biologique: effet de la structure et de la localisation des résidus sur les microorganismes du sol et leurs activités de minéralisation du carbone et de l'azote, éd. Thèse de Doctorat, l'Institut des Sciences et Industries du Vivant et de l'Environnement (Agro Paris Tech).

XANXOL A., SALONS C., CANTERO_MERTING ., 2006. Système de production de culture fourragères en semis direct dans la zone de la SUEDELLA, A l'Alada , en Espagne, option méditerranéennes ,Série A , Numéro 69 , pp 27-36.

ZAGHOUE O.P., ABDELLAOUI D., HOUASSINE., 2006. Quelle perspective pour l'agriculture de conservation dans les zones céréalières en condition Algériennes, Option méditerranéennes, Série A, Numéro 69, pp 183-187.

Zaire, 1994, Rapport national sur la population présenté à la conférence internationale sur la population et le développement, Cairo, Egypt., 65p.