

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
جامعة محمد بوضياف
كلية الآداب و العلوم الإجتماعية
قسم علم النفس و علوم التربية و الأطفونيا

ماسٲر ١١

2012 / 33

رقم:

الموضوع:

علاقه قلق الموت بظهور الأعراض السيكوسوماتية لدى المصابين بالقصور
الكلوي المزمن

دراسة ميدانية لعينة من المرضى المراجعين بمستشفى بوسعادة

مذكرة مكملة لنيل شهادة الماسٲر 2 في علم النفس العيادي

إشراف الأستاذة :

د: يامنة إسماعيلي

من إعداد الطالبة :

خديجة طرافي

لجنة المناقشة :

- 1- د/ محمد برو.....رئيسا
- 2- د/ يامنة إسماعيلي.....مشرفا ومقررا
- 3- أ / سعيد قارة.....عضوا

السنة الجامعية 2011 - 2012

ملخص الدراسة:

يحاول هذا البحث تسليط الضوء على علاقة بين قلق الموت وظهور الأعراض السيكوسوماتية لدى مرضى القصور الكلوي المزمن، حيث هدفت هذه الدراسة إلى كشف عن العلاقة بين قلق الموت والأعراض السيكوسوماتية لدى مرضى القصور الكلوي المزمن وحاولت اختبار الفرضيات الآتية:

- (1)- توجد علاقة بين درجات مقياس قلق الموت ودرجات قائمة كورنل للاضطرابات السيكوسوماتية حسب استجابة أفراد العينة.
 - (2)- توجد فروق ذات دلالة إحصائية في استجابة أفراد العينة الدراسة على مقياس قلق الموت حسب متغير الجنس.
 - (3)- توجد فروق ذات دلالة إحصائية في استجابة أفراد العينة الدراسة على قائمة كورنل للاضطرابات حسب متغير الجنس .
- ولاختبار هذه الفرضيات تم تطبيق كلا من مقياس قلق الموت و قائمة كورنل الجديدة للنواحي السيكوسوماتية وقد تكونت العينة من 30 مريض بالقصور الكلوي المزمن 14 ذكور و 16 إناث.
- وقد أظهرت النتائج الدراسة بأنه توجد علاقة بين قلق الموت والأعراض السيكوسوماتية لدى مرضى المصابين بالقصور الكلوي المزمن، وبينت كذلك بأنه توجد فروق ذات دلالة إحصائية في قلق الموت تعزى لمتغير الجنس وهي لصالح الإناث.
- فيما يخص قائمة كورنل للنواحي السيكوسوماتية فقد أظهرت النتائج أن الإناث معرضات أكثر للإصابة بالأعراض النفسجسدية من الذكور.

Résumé

Cette recherche tente de parler de l'angoisse de mort chez les patients atteints d'insuffisance rénale et de son rôle dans d'autres maladies. Le but de cette étude a révélé la relation entre l'angoisse de mort et les symptômes psychosomatiques chez les patients atteints d'insuffisance rénale et testé les hypothèses suivantes:

1)- Il existe une relation entre les degrés Test de l'angoisse de mort et les degrés Cornell liste des troubles psychosomatiques selon la réponse de l'échantillon.

2)- Il y avait des différences statistiquement significatives de la réponse de l'échantillon de l'étude à la Test de l'angoisse de mort par sexe variables.

3)- Il y avait des différences statistiquement significatives de la réponse de l'étude des échantillons sur Cornell liste des troubles psychosomatiques par sexe variables.

- Afin de tester l'hypothèse de test a été appliqué angoisse de la mort et de la liste Cornell des troubles psychosomatiques. L'échantillon était composé de 30 patients souffrant d'insuffisance rénale 14 hommes et 16 femmes.

- Les résultats ont montré qu'il existe une relation statistiquement significative entre l'angoisse de mort et les symptômes psychosomatiques chez les patients atteints d'insuffisance rénale

- Et aussi montré Il existe des différences significatives dans l'angoisse de mort qui est en faveur des femmes. En ce qui concerne la liste des troubles psychosomatiques Cornell, les résultats ont montré que les femmes sont plus vulnérables aux symptômes de dommages psychosomatiques des hommes.

Summary

This research attempts to talk about the fear of death in patients with renal failure and its role in other diseases. Purpose of this study revealed A relationship between death anxiety and the psychosomatic symptoms in patients with renal insufficiency and in-tested the following hypotheses:

1) - There is a relationship between levels of test-year anguish of death between degrees Cornell list of psychosomatic disorders Depending on the response of the sample.

2) - There were statistically significant differences in the response of the sample of the study was to test the fear of death by gender variables.

3) - There were statistically significant differences in the response of the study samples Cornell list of psychosomatic disorders by sex variables.

- To test the hypothesis test was applied-year anguish of death and list Cornell psychological disorders chosomatiques. The sample consisted of 30 patients with renal failure 14 men and 16 women.

-The results showed that there is a statistically significant relationship between death anxiety and psychosomatic symptoms in patients with renal

- And there are also shown significant differences in death anxiety is in favor of females. Regarding the list of disorders psychosomati a few Cornell, the results showed that women are more vulnerable to damage psychosomatic symptoms men.